



AVISO PREVENTIVO DE VIAJE A BRASIL POR FIEBRE AMARILLA

13 | Febrero | 2020

[UIES-AVISO-VIAJE-FA-v01-2020] →

Puntos clave:


- En Brasil, las personas enferman de Fiebre Amarilla de forma estacional, entre **diciembre y mayo**.
- Esta enfermedad se transmite través de las picaduras por mosquitos infectados, y se ha extendido por el territorio, desde las zonas selváticas, hasta zonas urbanas.
- Del **21-29 de febrero de 2020**, se celebrará el **Carnaval de Brasil**, esto puede aumentar los viajes hacia las regiones afectadas, por lo que se pudiera propagar el virus a otras zonas y países.
- Se recomienda la **aplicación de la vacuna contra Fiebre Amarilla** por lo menos **10 días antes de su viaje** a todos los viajeros que tengan entre 9 meses y 60 años de edad. **Una sola dosis es suficiente para estar protegido toda la vida.**

Nivel de riesgo

Nivel 2 MEDIO

Practique precauciones especiales.

Recomienda que los viajeros practiquen precauciones especiales de salud, como recibir vacunas adicionales.



Síntomas:

- Fiebre, dolor de espalda, cabeza y músculos, escalofrío, pérdida del apetito, náusea y vómito que desaparecen en 3 o 4 días.
- 15% de los enfermos presenta color amarillo en la piel, dolor abdominal y vómito.
- Puede presentarse sangrado de encías, nariz, ojos, sangre en vómito y en las heces.
- Los casos graves de enfermedad, presentan un porcentaje de defunción del 20 al 50%.
- No existe tratamiento curativo** para la Fiebre Amarilla.

Zonas afectadas:

- Durante esta temporada 2019-2020 se han confirmado en Brasil, 2 casos en humanos (en Pará y Santa Catarina) y 71 casos se encuentran en investigación (en Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima, Bahía, Maranhao, Distrito Federal, Goias, Minas Gerais, Espírito Santo, Río de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur).

Antes de su viaje:

No existe una restricción de viaje a Brasil, sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas.

- La **vacuna contra la fiebre amarilla se debe administrar a todos los viajeros que se dirijan a zonas con riesgo diez (10) días antes de iniciar su viaje** y debe ir acompañada de un **Certificado Internacional de Vacunación**.
- La vacuna debe aplicarse a partir de los 9 meses de edad, a excepción de: embarazadas, personas alérgicas a las proteínas del huevo, personas inmunodeprimidas que recibieron trasplante de órgano o un tratamiento con radiación o con medicamentos (como esteroides o quimioterapia), VIH/SIDA, enfermedad de la glándula de timo o tiene problemas con la glándula timo, enfermedad infecciosa aguda, encefalitis o cáncer.

Durante su viaje:

Protéjase de las picaduras de mosquitos mediante las siguientes acciones de prevención:

- Cubra la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones largos y sombreros. Use ropa de colores claros.
- Use repelente contra insectos (de venta en farmacias y siga las instrucciones del producto). Si usted también está usando protección solar, aplique el protector solar primero y después aplique el repelente contra insectos.
- Duerma en habitaciones cerradas con filtrado o aire acondicionado.
- Use un mosquitero o pabellón si el área donde usted está durmiendo está expuesta al exterior.

Si durante su viaje y hasta 7 días después de su regreso a México usted presenta fiebre, dolor muscular, dolor intenso en cabeza o espalda, escalofríos, pérdida de apetito, náuseas, vómito, coloración amarillenta de la piel y ojos y/o sangrado:

No se auto-medique y busque atención médica de inmediato.

- Si usted tiene síntomas de fiebre amarilla **procure no entrar en contacto con embarazadas, niños y personas enfermas**.
- Tome abundantes líquidos y vida suero oral o electrólitos orales para prevenir la deshidratación.
- Tenga los teléfonos, dirección del consulado o embajada de los Estados Unidos Mexicanos, para contactarlo en caso necesario.
- Si usted todavía está enfermo a su llegada a México**, por favor, **informe al asistente de vuelo** antes de aterrizar o el Oficial de Sanidad Internacional cuando salga del vuelo.
- Comente** con el personal médico que lo atienda **el antecedente de viaje** a estas regiones, así como de picaduras de mosquito.
- Dado que en México existe el vector es importante evitar las picaduras de mosquitos ante el riesgo de que el mosquito se infecte y se convierta en un potencial transmisor de la enfermedad.
- Todos los contactos directos del caso de Fiebre Amarilla también deben ser vacunados.**

Información adicional:

- | | |
|---|---|
| • Secretaría de Salud | www.salud.gob.mx |
| • Ministerio de Salud de Brasil | https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/fiebre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao |
| • Organización Panamericana de la Salud | https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9476:yellow-fever&Itemid=4072&lang=es |

Para cualquier duda puede comunicarse a la **UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA** a los teléfonos **55 5337-1845** o al **800-0044-800**, donde será atendido por personal altamente capacitado las 24 horas.