



AVISO PREVENTIVO DE VIAJE A PAÍSES ENDÉMICOS DEL POLIOVIRUS SALVAJE Y PAÍSES CON RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL POLIOVIRUS DERIVADO DE LA VACUNA.


11 | Agosto | 2022

[UIES-APV-VPDVC-v02.02-2022] →

Puntos clave:

- **La poliomielitis es una enfermedad altamente contagiosa** causada por un poliovirus que puede ocasionar parálisis flácida aguda y muerte.
- **Modo de transmisión:** El virus entra en el cuerpo a través de la boca, principalmente por alimentos o agua contaminada con heces. Se multiplica en garganta y tracto gastrointestinal, puede excretarse a través de secreciones nasofaríngeas durante una a dos semanas y en heces durante tres a seis semanas.
- **No existe cura** para la enfermedad, pero **se puede prevenir mediante la vacunación.**

Países, territorios y/o áreas con riesgo de propagación internacional del poliovirus:



Poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1): Afganistán Malawi, Mozambique, Pakistán.

Poliovirus circulantes de origen vacunal de tipo 1 (cVDPV1): Madagascar

Poliovirus circulantes de origen vacunal de tipo 2 (cVDPV2): Afganistán, Benin, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Eritea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Togo, Uganda, Ucrania, Yemen.

Poliovirus circulantes de origen vacunal de tipo 3 (cVDPV3): Israel

- **Se reportó un evento de parálisis flácida aguda confirmado a poliovirus derivado de la vacuna tipo 2 (cVDPV2) en un individuo no vacunado en el condado de Rockland, Nueva York, Estados Unidos.**

Síntomas: Parálisis flácida aguda por poliovirus.

- Fiebre (mayor o igual a 38 °C).
- Dolor de cabeza, náusea, vómito y dolor muscular.
- Forma grave: Parálisis o tono muscular disminuido, en una o varias extremidades.

Personas con mayor riesgo a infectarse y desarrollar la enfermedad:

- Población sin esquema o esquema incompleto de vacunación (vacuna inactivada tipo SALK o virus vivos atenuados tipo SABIN).
- Personas que viajen a lugares donde se hayan reportados casos de poliovirus salvaje tipo 1 y poliovirus circulantes de origen vacunal.

Nivel de riesgo

NIVEL 2 - BAJO

Practicar precauciones especiales y específicas.

La posibilidad de enfermar por este evento es medio, y existen medidas médicas específicas contra esta enfermedad.




Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis OPS

Aquí puedes consultar la información completa de la situación epidemiológica.

Antes de su viaje:

Manténgase informado de la situación de su destino.

Asegúrese de tener su esquema completo de vacunación

 contra la poliomielitis.

- Niños: en México se aplica la vacuna inactivada de poliovirus tipo 1, 2 y 3 (IPV) eficaz contra poliomielitis, incluida en el componente de la **vacuna Hexavalente** y aplicada en un esquema de cuatro dosis (2, 4, 6 y 18 meses de edad).
- Adultos: México no cuenta con aplicación de refuerzo de IPV para adultos.

Durante su viaje:

- **Realice higiene de manos con frecuencia** (use jabón y agua durante al menos 20 segundos; también puede usar soluciones a base de alcohol gel al 70 %) y **evite tocarse nariz, boca y cara.**
- **Consuma alimentos bien cocidos.**
- Consuma **agua embotellada** o que haya sido hervida o desinfectada; y en caso de consumir leche, que sea pasteurizada.

Después a su viaje:

- Si viajó a alguno de estos países y a su regreso a México presenta algún signo o síntoma de la enfermedad hasta 35 días después de su retorno, solicite atención médica inmediata, refiriendo su antecedente de viaje.

Información adicional:

- 32° Comunicado del Comité de Emergencias de Poliomielitis. <https://www.who.int/news/item/24-06-2022-statement-of-the-thirty-second-polio-ihf-emergency-committee>
- Organización Mundial de la Salud <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis>
- Estrategia Mundial para la Erradicación contra la Poliomielitis <https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2022/07/Standard-Operating-Procedures-For-Responding-to-a-Poliovirus-Event-Or-Outbreak-20220807-EN-Final.pdf>
- Organización Panamericana de la Salud <https://www.paho.org/es/temas/poliomielitis>

Para cualquier duda puede comunicarse a la **UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA** a los teléfonos **55 5337-1845** y **800-0044-800**, donde será atendido por personal altamente capacitado, disponible las 24 horas.

